



Dauphin à nez blanc

Lagenorhynchus albirostris



doris.ffessm.fr © Joël DETCHEVERRY

37 ANS 180 – 350 KG 2.3 – 3.1 M

Le **dauphin à nez blanc** (*Lagenorhynchus alabastrites*), aussi appelé **dauphin à bec blanc** ou encore **lagénorhynque à bec blanc** (Gray, 1846) est présent dans les eaux de l'[Atlantique Nord](#).

Comme tous les cétacés, le dauphin à bec blanc est vivipare* ; les femelles donnent naissance à leurs petits et les allaitent sous l'eau. Chez cette espèce, la saison de reproduction s'étend de juillet à août. Comme chez la plupart des dauphins, la gestation est de 11 mois. Les femelles mettent généralement bas à un unique petit au cours de l'été, entre juin et septembre. Le jeune mesure de 1,20 à 1,60 m et pèse environ 40 kg à la naissance. La maturité sexuelle est atteinte lorsque la taille des individus est de 1,95 m, soit à un âge moyen de 8,7 ans chez les femelles.

Le dauphin à bec blanc est une espèce grégaire, pouvant former des groupes allant jusqu'à 1500 individus, mais préférant généralement se déplacer par groupe de 6 à 10. Ils nagent à une vitesse moyenne allant de 19 à 37 km/h

Leur chasse organisée et coordonnée consiste à regrouper les poissons et les pousser vers la surface, où les proies seront piégées et pourront être facilement capturées.

