



Phoque barbu *Erignathus barbatus*



20-25 ANS 360 KG 2.1-2.4 M

Le **phoque barbu** (*Erignathus barbatus*) est une [espèce](#) de [mammifères carnivores](#), de la [famille](#) des [phocidés](#), la seule du [genre](#) *Erignathus*.

Il existe deux sous espèces : *Erignathus barbatus barbatus* qui se trouve dans l'Atlantique Nord, le nord-est du Canada, la mer de Laptev et la mer de Barents, et *Erignathus barbatus nauticus* qui se trouve dans le reste de son aire de répartition

La maturité sexuelle est atteinte entre 5 ans (femelle) et 6-7 ans (mâle). La mise-bas a lieu entre fin mars et mi-mai (varie selon les positions géographiques) après une gestation de 11 mois sur la banquise (pic des naissances en avril). La femelle donne naissance à un unique petit. L'allaitement dure entre 18 et 24 jours. Les jeunes sont aptes à nager dès la naissance. Les accouplements reprennent dans l'eau dès que les jeunes sont sevrés.

Pendant la période de reproduction, les mâles émettent des sons de longue portée. Les cris sont longs, mélodieux et de fréquences variables, ils se terminent par des gémissements courts. On suppose que c'est pour signaler leur territoire et attirer les femelles. Les mâles s'affrontent dans de violents combats territoriaux et s'infligent parfois des blessures importantes.

